

B I J D R A G E
TOT DE KENNIS DER
ICHTHIJOLOGISCHE FAUNA
VAN HET EILAND
G R O O T - O B I J .
DOOR
P. B L E E K E R .

Groot-Obij is, zooals bekend is, het grootste eiland eener groep, welke gelegen is ten zuiden van het eiland Batjan en ten noorden van Straat Boeroe of Manipa. In een ichthijologisch, gelijk in zoovele andere opzichten, zijn de Obij-eilanden nog volstrekt onbekend gebleven. Zeer welkom waren mij alzoo enige vischsoorten, aan de kusten van Groot-Obij verzameld en mij door den heer Jkhr C. F. GOLDMANN, gouverneur der Moluk-sche eilanden, welwillend toegezonden. Deze verzameling stelt mij in staat eene eerste bijdrage tot de ichthijologische kennis van dit eiland te geven en bevat de volgende soorten.

1. *Serranus Goldmanni* Blkr., Nat. T. N. I. IX. p. 434.
2. " *guttatus* CV. = *Serranus cyanostigmatooides* Blkr., Verh. Bat.-Gen. XXII. Perc.

3. *Serranus hexagonatus* CV., Nat. T. Ned. Ind. VI p. 191.
4. » *urodelus* CV., ibid. VII p. 38.
5. *Mesopriion amboinensis* Blkr. ibid. III p. 259.
6. » *bottonensis* Blkr = *Mesopriion janthinurus* Blkr, ibid. II p. 170 et VI p. 52.
7. » *semicinctus* Blkr, ibid. V p. 331.
8. *Therapon Cuvieri* Blkr, ibid. VI p. 211.
9. » *theraps* CV., Verh. Batav. Genootsch. XXII Perc.
10. *Sphyraena obtusata* CV., ibid. XXVI Sphyr. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. VII p. 369.
11. *Upeneus trifasciatus* CV., Nat. T. N. Ind. II p. 237.
12. *Upeneoides vittatus* Blkr, = *Upeneoides bivittatus* Blkr.
13. *Scolopsides lycogenis* CV., Verh. Bat. Gen. XXIII Seiaen.
14. *Heterognathodon bifasciatus* Blkr, ibid.
15. *Lethrinus Moensii* Blkr, Nat. T. N. I. IX. p. 435.
16. *Chaetodon baronessa* CV., ibid. II p. 239.
17. » *strigangulus* Sol., ibid. II p. 239.
18. » *vittatus* Bl., Verh. Bat. Gen. XXIII Chaet.
19. *Heniochus macrolepidotus* CV., ibid.
20. *Holacanthus mesoleucus* CV., ibid.
21. » *Vrolikii* Blkr, Nat. T. N. Ind. V p. 339.
22. *Caranx ekala* CV., Verh. B. Gen. XXIV Makr.
23. *Gazza tapeinosoma* Blkr, Nat. T. Ned. Ind. IV p. 260.
24. *Cichlops Hellmuthii* Blkr, ibid. VI p. 329.
25. *Amphiprion percula* CV., ibid. III p. 287.
26. » *perideraion* Blkr, ibid. IX p. 437.
27. *Glyphisodon sordidus* CV., Verh. Bat. Gen. XXI Labr. Cten.
28. *Cheilinus celebicus* Blkr, Nat. T. Ned. Ind. V p. 171.
29. *Sardinella leiogaster* CV., Verh. B. Gen. XXIV Har.
30. *Pellona Hoevenii* Blkr, ibid. Nat. T. Ned. Ind. III p. 712.
31. *Balistes armatus* Lac., ibid. XXIV Balist., ibid. II p. 224.
32. » *lineatus* Bl. Schn. ibid., ibid. II p. 260.

Hoe weinig talrijk aan soorten deze verzameling is, bevat zij toch weder eenige nieuwe. Alle 32 soorten zijn nieuw voor de kennis van Groot-Obij. 7 dier soorten waren nog niet van de Molukken bekend geworden, t. w. *Serranus Goldmanni* Blkr, *Serranus urodelus* CV., *Lethrinus Moensii* Blkr, *Amphiprion perideraion* Blkr, *Sichlops Hellmuthii* Blkr, *Glyphisodon sordidus* CV. en *Balistes armatus* Lac., terwijl ik drie

dezer soorten beschouw als nieuw voor de wetenschap, t. w.
Serranus Goldmanni, *Lethrinus Moensi* en *Amphiprion pe-
rideraion*.

DESCRIPTIONES SPECIERUM DIAGNOSTICAE.

PERCOIDEI.

Serranus Goldmanni Blkr.

Serran. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{3}{4}$ circiter in ejus altitudine; capite 3 et paulo in longitudine corporis; altitudine capitis $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus longitudine; oculis diametro $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine capitis; linea rostro-dorsali rostro et vertice convexiuscula supra oculos concava; rostro squamoso; maxilla superiore maxilla inferiore breviore, post oculum desinente, capite duplo fere breviore; osse supramaxillari squamis minimis sed bene conspicuis; osse intermaxillari dentibus pluriseriatis serie externa conicis, seriebus internis setaccis antice longioribus in thurmas 2 collocatis et insuper caninis 2 vel 4 parvis; maxilla inferiore dentibus antice pluriseriatis serie interna longioribus antice caninis 2 parvis; praecoperculo obtusangulo, margine posteriore anguloque dentato, dentibus plus quam 30 angularibus ceteris majoribus; suboperculo interoperculoque edentulis; operculo spinis 3, spina media spinis ceteris longiore; dorso elevato ventre multo convxiore; squamis lateribus 85 p. m. in serie longitudinali; pinnis dorsali et anali rotundatis; dorsali spinosa dorsali radiosa paulo humiliore, spinis 4^a, 5^a et 6^a spinis ceteris longioribus corpore plus duplo humilioribus, spina 1^a spina 4^a duplo breviore, membrana inter singulas spinas emarginata non lobata; pectoralibus obtusis rotundatis 5 circiter, ventralibus acutiuscula rotundatis 6 circiter, caudali obtusa rotundata 5 $\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; anali spina media spinis ceteris longiore corpore vix plus duplo humiliore; colore corpore superne roseo-viridi, inferne margaritaceo; capite corporeque ubique guttulis confertis fuscescentibus et fuscescente-aurantiacis; capite et dorso antice insuper nebulis irregularibus fuscis; canda superne macula magna nigra superne cum macula lateris oppositi unita inferno lineam lateralem attingente; pinnis viridescente-aurantiacis, guttis aurantiaco-fuscis et fuscis (nec ocellatis nec centro punctatis nee fasciatim seriatim) sat dense obsitis et, pectoralibus exceptis, nigro marginatis.

B. 7. D. 11/14 vel 11/15. P. 2/14. V. 1/5. A. 3/8 vel 3/9. C. 17 et lat. brev.

Habit. Trop. Oby major, in mari.
Longitude speciminis nunc 176°.

Aann. Deze Serranus, welke ik opdraag aan den toezender Jkhr C. F. GOLDMANN, gouverneur der Moluksche eilanden, is zeer na verwant aan *Serranus horridus* K. v. H. Zij is echter stellig eenen verschillende soort en van *Serranus horridus* K. v. H. onderkenbaar door slanker ligchaam, betrekkelijk grooteren kop en spitser profiel, veel sterker ontwikkelden middelsten aarsvindoorn, een geringer aantal borstvinstralen, en andere bijzonderheden der wolk- en vlektekening, vertoonende de vlekken der ongepaarde en der buikvinnen bij *Serranus horridus* meest alle zwarte stippen in het centrum, de borstvinnen dwarsche banden, enz. *Serranus fusco-guttatus* Rüpp., welke ik slechts, ken uit de beschrijving en afbeelding van den heer RÜPPELL, schijnt in verwantschap te staan tusschen de onderwerpelijke soort en *Serranus horridus*. De afbeelding van den heer RÜPPELL vertoont echter van beide genoemde soorten afwijkende vormen en evenredigheden van ligchaam en vinnen en bovendien een grooten hondstand op het midden der lengte van de onderkaak, evenals *Serranus punctulatus* CV.

SPAROIDÆI.

Lethrinus Moensii Blkr.

Lethrinus. corpore oblongo compresso, altitudine 4 circiter in ejus longitudine, latitudine $1\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite acento $3\frac{1}{2}$ ad 4 sero in longitudine corporis; altitudine capitinis $1\frac{1}{2}$ sirciter in ejus longitudine; oculis diametro 3 et paulo ad $3\frac{1}{2}$ in longitudine capitidis; linea rostro-frontali ante oculos convexa, rostro declivi concaviuseula; fronte plana; nucha non gibbosa; rostro acuto oculo multo longiore; maxillis subaequalibus, superiore ante oculum desinente; dentibus utraque maxilla serie externa antice caninis 4 magnis curvatis, lateribus omnibus conicis curvatis, inaequalibus, series internis minimis; labiis carnosis; osse suborbitali angulo oris oculi diametro multo altiore; praecoperculo obtusangulo rotundato; operculo posse spinis 2 plantis, spina superioro vix conspicua; linea dorsali taurorant

linea ventrali convextiore; squamis ciliatis, lateribus 50 circiter in serie longitudinali; pinna dorsali spinis omnibus osseis, spina 3^a ceteris longiore corpore plus duplo humiliore, parte radiosa obtusa rotundata; pectoralibus acutis 4 $\frac{1}{2}$ ad 5 et paulo, ventralibus acutis 6 circiter, caudali profunde emarginata lobis acutis superiore inferiore longiore 5 circiter in longitudine corporis; anali spina 3^a spinis ceteris longiore parte radiosa postice angulata humiliore; colore corpore superne aurantiaco-viridi, inferne flavescente vel roseo-margaritaceo; capite superne, rostro genisque profunde olivaceis; dorso lateribusque vestigiosis diffusis fasciarum 7 p. m. transversarum fuscarum; aetate minus provectis macula magna oblonga nigrante sub anteriore dimidio dorsalis radiosae maxima parte sub linea laterali sita; pinnis membrana coeruleo-hyalinis, radiis aurantiacis; dorsali singulis spinis radiisque basi macula fusca; membrana operculari oreque interne magna parte rubris.

B 6. D. 10/9 vel 10/10 P. 2/11. V. 1/5 A. 3/8 vel 3/9. C. 1/15/1
et lat. brev.

Habit Ins. Obij major, in mari.

Batjan, in mari.

Longitudo 2 speciminum 245''' et 305'''.

Aanm. In habitus heeft deze soort zeer veel van *Lethrinus amboinensis* Blkr (1), doch deze verschilt er van door de afwezigheid (reeds bij jonge voorwerpen) van de groote zijvlek achter den top der borstvin en door dwarsche violette streepjes der stralen van de ongepaarde vinnen. Deze verschillen zijn echter van geringe waarde. Mijn grootste voorwerp van *Lethrinus amboinensis*, slechts eene lengte bezittende van 115" en dus veel kleiner zijnde dan het kleinste der bovenbeschrevene voorwerpen, kan ik niet beslissen of de bedoelde verschillen slechts betrekking hebben tot leeftijdstoestanden. Evenwel houd ik haar voorloopig voor eene eigene soort. Bij *Lethrinus amboinensis* bevindt zich wel eene zwarte zijvlek boven de borstvin, doch geene achter den top der borstvin. Deze donkere zijvlekken verdwijnen dikwerf doch slechts in den gevorderden leeftijd bij de soorten van *Lethrinus* (ook van *Mesopriion*), en de afwe-

(1) In de beschrijving dezer soort (Nat. Tijdschr. N. Ind. VI p. 490) staat als drukfout dat de kop 4 $\frac{1}{2}$ maal zou gaan in het lichaam; lees 3 $\frac{1}{2}$.

zighed er van bij de kleine voorwerpen van *Lethrinus amboinensis*, tegenover de aanwezigheid er van bij bovenbeschreven voorwerp van meer dan de dubbele lengte, schijnt voor de zelfstandigheid van *Lethrinus Moensii* als soort te pleiten.

Ik ontving haar gelijktijdig van Groot-Obij en Batjan, van laatstgenoemd eiland door den heer J. G. T. BERNELOT MOENS, officier van gezondheid der tweede klasse bij het nederlandsch-indische leger.

LABROÏDEI CTENOÏDEI.

Amphiprion perideraion Blkr.

Amphipr. corpore oblongo compresso, altitudine 3 fere in ejus longitudine, latitudine $2\frac{1}{2}$ circiter in ejus altitudine; capite obtuso 4 et paulo in longitudine corporis, paulo altiore quam longo; linea rostro-dorsali convexa supra oculos tantum concaviuscula; fronte planiuscula squamosa oculis diametro 3 circiter in longitudine capitum; osse suborbitali sub oculo oculi diametro duplo circiter humiliore, valde emarginato, dentibus numerosis bene conspicuis serrato, spina majore nulla; maxillis aequalibus dentibus subconicis obtusis valde conspicuis; maxilla superiore sub oculi margine anterior desinente; rictu curvato; praecoperculo subrectangulo angulo rotundato, denticulato-crenulato; ossibus opercularibus ceteris spinoso-dentatis spinis gracilibus; squamis lateribus 55 p. m. in serie longitudinali; linea laterali simplice sub pinnae dorsalis radiosae dimidio posteriore interrupta; pinna dorsali partem spinosam inter et radiosam parum emarginata, parte spinosa parte radiosa humiliore spinis mediis spinis ceteris longioribus, parte radiosa obtusa rotundata corpore plus duplo humiliore; pectoralibus obtusis rotundatis $4\frac{1}{2}$ circiter, ventralibus obtusis $6\frac{1}{2}$ circiter, caudali medio postice vix emarginata, angulis obtusis rotundatis, $4\frac{1}{2}$ circiter in longitudine corporis; anali obtusa convexa dorsali radiosa humiliore; colore corpore pinnisque pulchre aurantiaco; squamis corpore singulis puncto margaritaceo-coeruleo; vitta capitum linea media rostro-dorsali coerulea basin pinnae dorsalis amplectente et dorso caudae desinente; fascia transversa nuchae-operculari margaritacea fusco limbata.

B. 5. D. 10/16 vel 10/17. P. 2/15. V. 1/5. A. 2/13 vel 2/14. C. 8/14/9 (lat. brev. incl.)

Habit. Ins. Obij major, in mari.

Longitudo speciminis unius 56".

Aanm. In mijne Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra, Tiental V—X (Nat. Tijdschr. Ned. Ind. IV p. 281) beschreef ik onder den naam van *Amphiprion akalopisos* een soort, welke zeer na aan de onderwerpelijke verwant is, zoowel in bouw als eenvoudigheid van kleurtekening (1), doch er van verschilt door minder stomp profiel, minder uitgerand onderoogkuilsbeen, talrijker rugvinstralen en afwezigheid van den parelkleurigen nekoperkelband, aan welken ik den naam der onderwerpelijke soort heb ontleend.

Scripsi Batavia Calendis Julii MDCCCLV.

(1) Sedert het publiceren dier beschrijving, ontving ik nog vier andere voorwerpen van *Amphiprion akalopisos*, welke mij geleerd hebben, dat de schubvlekjes niet rood maar lichtblauw zijn. Bovendien vertonen zij even als *Amphiprion perideraion* een' lichtblauwen band, die van de middellijn van snuit en voorhoofd naar de rugvin loopt, deze aan haro basis omvat en op den rug van den staart eindigt. Het aantal rugdoornen en rugvinstralen verschilt er tuschen 10/18 tot 9/21.